



102 TER RUE LAZARE CARNOT  
ZONE DE LA TUILERIE - ATELIER 5  
62790 LEFOREST

09 64 24 29 02  
06 47 81 30 06

contact@vacom-db.fr

# PÂTE RATICIDE

## CONTRE RATS ET SOURIS

### PROPRIÉTÉS PRINCIPALE/ACTION

Pâte fraîche à base de Brodifacoum 25ppm en sachets de 10g et conditionnement professionnel de 5 kg.

Pâte fraîche extrêmement appétente, spéciale cas difficiles.

Cette pâte raticide et souricide a un effet radical sur les rats et souris pour une élimination rapide.

Les sachets de 10g permettent un dosage facile pour une application simple.

Produit professionnel anti-rats et anti-souris.

Contre

Souris domestique, rat brun, rat noir.

Dosage facile, effet durable

### PRÉCAUTIONS

Les postes d'appâtage doivent être clairement étiquetés pour indiquer qu'ils contiennent des rodenticides et qu'ils ne doivent être ni déplacés ni ouverts. Lorsque le produit est utilisé dans des lieux publics, les zones traitées doivent être signalées pendant la période de traitement et une note expliquant le risque d'empoisonnement primaire ou secondaire par l'anticoagulant ainsi que les premières mesures à adopter en cas d'empoisonnement doit être apposée à proximité des appâts. L'appât doit être sécurisé de façon à ce qu'il ne puisse pas être déplacé à l'extérieur du poste d'appâtage. Placer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux d'élevage et autres animaux non cibles. Placer le produit à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi que des ustensiles ou des surfaces entrant en contact avec ces derniers. Ne pas laver à l'eau les postes d'appâtage entre les applications ou les ustensiles utilisés dans les postes d'appâtage. Éliminer les cadavres des rongeurs dans un circuit de collecte approprié. Ne pas manger, boire, ni fumer lors de l'utilisation du produit. Se laver les mains et toute zone de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât. Les rongeurs peuvent être porteurs de maladies. Ne pas toucher les cadavres de rongeurs à mains nues; porter des gants ou utiliser des instruments tels que des pinces pour les éliminer.

### MODES ET DOSES D'EMPLOI

Avant de placer un appât, faire un diagnostic préalable et une évaluation sur site de la zone infestée pour identifier les espèces de rongeurs, leurs lieux d'activité et déterminer la cause probable ainsi que l'ampleur de l'infestation.

Retirer toute nourriture

facilement accessible pour les rongeurs (par exemple, descréales éparpillées ou des déchets alimentaires)

Par ailleurs, ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela perturbe la population des rongeurs et rend l'acceptation de l'appât plus difficile.

Le produit ne doit être utilisé que dans le cadre d'un système de lutte intégrée incluant notamment des mesures d'hygiène et, si possible, des méthodes physiques de contrôle.

Le produit doit être placé à proximité immédiate des endroits où une activité de rongeurs a été observée (par exemple, parcours, sites de nidification, parcs d'engraissement, trous, terriers, etc.)

Les postes d'appâtage doivent, si possible, être fixés au sol ou à d'autres structures.

Rats:

- Forte infestation : 100 grammes de produit par point d'appât espacés de 5 mètres.

- Faible infestation : 100 grammes de produit par point d'appât espacés de 10 mètres.

Souris :

- Forte infestation : 10 grammes de produit par point d'appât espacés de 3 mètres.

- Faible infestation: 10 grammes de produit par point d'appât espacés de 5 mètres.

### COMPOSITION

Brodifacoum (CAS : 56073-10-0) : 0.0025 %